

STANDARD AGAPORNIS PULLARIUS PULLARIUS

Dados gerais:

Estas aves têm grande distribuição geográfica da África Ocidental para a África Central. Podem ser vistos também no norte do Congo, e no lago Vitoria. Na natureza, nidificam em termiteiras (ninhos das formigas Térmitas). O Agapornis pullarius terá sido introduzido pela primeira vez na Europa por volta de 1730. As aves importadas são de natureza muito inquieta e são muito difíceis de se aclimatar. Há muito poucos resultados de reprodução conhecidos. Nos últimos anos, um casal de criadores amadores Europeus começaram a especializar-se na reprodução desta espécie. Em 1996, Jacques Flamand Boussu apresentou pela primeira vez um stam de pullarius na exposição da BVA e no campeonato do mundo de Charleroi. Além da espécie Agapornis pullarius pullarius, há também uma subespécie de Agapornis pullarius ugandae, esta subespécie foi descoberta e descrita em 1908, difere da forma original por possuir o uropígio azul céu claro. O Agapornis pullarius ugandae vive no Uganda, provavelmente estas aves nunca foram importadas.



Autorizada a utilização e tradução por:

Todos os direitos reservados / fonte:

Standard comum do: *Agapornis pullarius pullarius*

Estabelecido pelos comités técnicos de: ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV, PSC, Psittacula Pays-Bas, NBvV, yc MUTAVI © 2002 - 2011

Versão 2.5 de Outubro de 2011

Traduzido e elaborado por: **Luis Grencho / 2013** – Adaptação para a Exposição BVA-Portugal - AOB “Cidade de Barcelos”
por: **Francisco Faria / 2021**

Índice

Características físicas:	2
Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Macho	2
Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Fêmea	3



Características físicas:

Comprimento: 14 cm da coroa à ponta da cauda.

Cabeça:

- Testa:** ligeiramente arqueada do bico a coroa.
- Coroa:** arredondada.
- Nuca:** completa.
- Pescoço:** deve mostrar uma ligeira depressão.
- Bochechas:** completas, em harmonia com a cabeça.

Olhos: colocados centralmente e brilhantes.

Bico: largo na base, intacto, totalmente inserido, a ponta da mandíbula superior voltada para o peito e a mandíbula inferior é incorporada na mandíbula superior.

Peito: largo, bem arredondado, completo e elegante.

Abdómen: perfeitamente ligado na continuação do peito.

Região anal: harmoniosamente ligada com a linha do abdómen.

Asas: bem coladas ao corpo e base da cauda. Todas as penas devem estar intactas, presentes sem cair nem cruzar.

Ombros: largos.

Pernas: curtas e firmes, dois dedos para a frente, dois para trás, todos intactos, apertados no poleiro.

Unhas: uniformemente curvadas, todas intactas e presentes.

Atitude: elegante, forte e orgulhoso.

Plumagem: limpa, completa e ligeiramente brilhante.

Uropígio: em linha recta com a cauda.

Cauda: em cunha com a ponta ligeiramente arredondada.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Macho

Denominação internacional: Green

Fórmula genética: bl+_D+ / bl+_D+

Testa: vermelho alaranjado.

Coroa: vermelho alaranjado.

Bochechas: vermelho alaranjado.

Garganta: vermelho alaranjado.

Olhos: castanho escuro, bordado com pequenas penas brancas e azuis.

Bico: vermelho alaranjado, com os bordos brancos.

Peito, flancos, abdómen e região anal: verde claro.

Coberturas das asas e manto: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente martelado.

Coberturas infra-alares: Preto.

Remiges primárias: cinza escuro, com bordo exterior verde.

Curva das asas: pequenas penas pretas com penas azuis, brancas e amarelas.

Uropigio: azul.

Penas infra-caudais: verde claro.

Retrizes: amarelo na base depois ao centro um desenho transversal preto e vermelho alaranjado. A ponta da cauda é verde claro.

Pernas: cinza.

Unhas: de cor cinza claro na base, até cinza escuro na ponta.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Fêmea

Denominação internacional: Green

Fórmula genética: bl+_D + / bl+_D+

Testa: laranja claro.

Coroa: laranja claro.

Bochechas: laranja claro.

Garganta: laranja claro.

Olhos: castanho-escuro, bordado com pequenas penas amarelas.

Bico: laranja claro, com os bordos brancos.

Peito, flancos, Abdómen e região anal: verde claro.

Coberturas das asas e manto: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente martelado.

Coberturas infra-alares: verde.

Remiges primárias: cinza escuro, com bordo exterior verde.

Curva das asas: pequenas penas amarelas.

Uropigio: azul.

Penas infra-caudais: verde claro.

Retrizes: amarelo na base depois vermelho alaranjado, passando a um desenho transversal preto. A ponta das penas da cauda é verde claro.

Pernas: cinza.

Unhas: de cor cinza claro na base, até cinza escuro na ponta.

